

【1】 正規採用薬品に関するお知らせ

■ 正規採用薬品として以下16製剤18品目の薬剤が承認されました。

1	エフィエント錠2.5mg 【組成】 1錠中 プラスグレル塩酸塩2.74mg（プラスグレルとして2.5mg） 【効能・効果】 ○経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される下記の虚血性心疾患 急性冠症候群（不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗塞） など ★パナルジン錠100mgは院外採用薬品へ区分変更	第一三共 抗血小板剤	脳神経外科
2	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 【組成】 1錠中 トルバプタン7.5mg V2-受容体拮抗剤 【効能・効果】 ○ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留 ○ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な肝硬変における体液貯留 ★サムスカOD錠7.5mgは院外採用薬品へ区分変更	大塚製薬	循環器内科
3	アダラートCR錠40mg 【組成】 1錠中 日局ニフェジピン40mg 持続性Ca拮抗剤（高血圧・狭心症治療剤） 【効能・効果】 ○高血圧症、腎実質性高血圧症、腎血管性高血圧症 ○狭心症、異型狭心症 ★ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」は削除、ニフェジピンL錠10mg「サワイ」は院外採用薬品へ区分変更	バイエル	循環器内科
4	ノイキノン錠10mg 【組成】 1錠中 コピデカレノン 10mg 代謝性強心剤 【効能・効果】 ○基礎治療施行中の軽度及び中等度のうつ血性心不全症状 ★コピデカレノン顆粒1%「ツルハラ」は削除	エーザイ	薬剤部
5	フェロミア顆粒8.3% 【組成】 1.2g中クエン酸第一鉄ナトリウム941.8mg（鉄として100mg） 【効能・効果】 ○鉄欠乏性貧血 ★クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」は削除	エーザイ 可溶性の非イオン型鉄剤	薬剤部
6	バクタミン配合錠 【組成】 1錠中 トリメトプリム 80mg 日局スルファメトキサゾール 400mg 【効能・効果】 ○一般感染症 ○ニューモシス肺炎の治療及び発症抑制 ★ダイフェン配合錠は削除	太陽ファルマ 合成抗菌剤	薬剤部
7	バクタミン配合顆粒 【組成】 1g中 トリメトプリム 80mg 日局スルファメトキサゾール 400mg 【効能・効果】 ○一般感染症 ○ニューモシス肺炎の治療及び発症抑制 ★ダイフェン配合顆粒は削除	太陽ファルマ 合成抗菌剤	薬剤部
8	バルトレックス顆粒50% 【組成】 1g中 日局バラシクロビル塩酸塩556mg（バラシクロビルとして500mg） 【効能・効果】 ○単純疱疹 ○造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症（単純疱疹）の発症抑制 ○帯状疱疹 ○水痘 ○性器ヘルペスの再発抑制 ★バラシクロビル顆粒50%「SPKK」は削除	グラクソ・スミスクライン 抗ウイルス化学療法剤	薬剤部
9	カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」 【組成】 1カプセル中 カルシトリオール0.25μg 活性型ビタミンD3製剤 【効能・効果】 ○骨粗鬆症 ○下記疾患におけるビタミンD代謝異常に伴う諸症状（低カルシウム血症、しびれ、テタニー、知覚異常、筋力低下、骨痛、骨病変等）の改善 ★ロカルトロールカプセル0.25は削除	沢井製薬	薬剤部
10	パロキセチン錠10mg「明治」 【組成】 1錠中 日局パロキセチン塩酸塩水和物11.38mg（パロキセチンとして10mg） 【効能・効果】 ○うつ病・うつ状態 ○パニック障害 ○強迫性障害 ○社会不安障害 ○外傷後ストレス障害 ★パロキセチン錠10mg「SPKK」は削除	Meiji Seika ファルマ 選択的セロトニン再取り込み阻害剤	薬剤部
11	バルクス注5μg 【組成】 1mL 日局アルブロスタジル5μg プロスタグランジンE1製剤 【効能・効果】 ○慢性動脈閉塞症（パージャー病、閉塞性動脈硬化症）における四肢潰瘍ならびに安静時疼痛の改善 ○下記疾患における皮膚潰瘍の改善 など ★バルクス注10μgは削除	大正製薬	薬剤部
12	水溶性ハイドロコートン注射液100mg 【組成】 1バイアル（2mL）中 ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム134.2mg（ヒドロコルチゾンとして100mg） 【効能・効果】 ○外科的ショックおよびショック状態における救急、または術中・術後のショック ★ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」、水溶性ハイドロコートン注射液500mgは削除	日医工 副腎皮質ホルモン製剤	薬剤部
13	ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」 【組成】 1バイアル（10mL）中 10,000ヘパリン単位 【効能・効果】 ○汎発性血管内血液凝固症候群の治療 ○血液透析・人工心肺その他の体外循環装置使用時の血液凝固の防止 など ★ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」は削除	陽進堂	薬剤部
14	ダルベボエチン アルファ注120μg,180μgシリンジ「KKF」 【組成】 1シリンジ 0.5mL ダルベボエチン アルファ（遺伝子組換え）120μg,180μg 【効能・効果】 ○腎性貧血 ○骨髄異形成症候群に伴う貧血 ★ネスブ注射液120μg,180μgブラシリンジは削除	協和キリン 持続型赤血球造血刺激因子製剤	薬剤部
15	エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 【組成】 1バイアル中 エビルピシン塩酸塩10mg（力価） 【効能・効果】 ○下記疾患の自覚的並びに他覚的症状の緩解 急性白血病、悪性リンパ腫、乳癌、卵巣癌、胃癌、肝癌、尿路上皮癌（膀胱癌、腎盂・尿管腫瘍） など ★エビルピシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」は削除	日本化薬 抗腫瘍性抗生物質製剤	薬剤部
16	エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL,50mg/25mL「NK」 【組成】 1バイアル 5mL中 エビルピシン塩酸塩10mg（力価）,25mL中 エビルピシン塩酸塩50mg（力価） 【効能・効果】 ○下記疾患の自覚的並びに他覚的症状の緩解 急性白血病、悪性リンパ腫、乳癌、卵巣癌、胃癌、肝癌、尿路上皮癌（膀胱癌、腎盂・尿管腫瘍） など ★エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL,50mg/25mL「サワイ」は削除	日本化薬 抗腫瘍性抗生物質製剤	薬剤部

【2】 仮採用薬品に関するお知らせ

■ 仮採用薬品として以下1製剤1品目の薬剤が承認されました。

1	フリエビアクト静注25mg 【組成】 1バイアル（2.5mL）中ブリーバラセタム25mg 【効能・効果】 ○一時的に経口投与ができない患者における、下記の治療に対するブリーバラセタム経口製剤の代替療法 など ★アレバアチン錠100mgは院外採用薬品へ区分変更	ユーシービー・ジャパン 抗てんかん剤	脳神経外科
---	---	------------------------------	-------

【3】 必要時採用薬品に関するお知らせ

■ 必要時採用薬品として以下2製剤2品目の薬剤が承認されました。

- 1

イムブルピカカプセル140mg

ヤンセンファーマ

薬剤部

【組成】 1カプセル中 イブルチニブ140mg 抗悪性腫瘍剤（ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤）
【効能・効果】 ○慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む） ○原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫 ○マントル細胞リンパ腫 など
★ネスブ注射液30μgブラシリンジは削除
- 2

ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」

第一三共

薬剤部

【組成】 1錠中 ヒドロキシクロロキン硫酸塩 200mg 免疫調整剤
【効能・効果】 ○皮膚エリテマトーデス、全身性エリテマトーデス
★ブラケニル錠200mgは削除

【4】 院外採用薬品に関するお知らせ

■ 院外採用薬品として以下6製剤10品目の薬剤が承認されました。

- 1

ロスバスタチンOD錠10mg「トーフ」

東和薬品

循環器内科

【組成】 1錠中 日局 ロスバスタチンカルシウム 10.4mg（ロスバスタチンとして10mg） HMG-CoA還元酵素阻害剤
【効能・効果】 ○高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症
- 2

ノアルテン錠(5mg)

富士製薬工業

産婦人科

【組成】 1錠中 日局 ノルエチステロン 5mg 経口黄体ホルモン剤
【効能・効果】 ○無月経、月経周期異常（稀発月経、多発月経）又は生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整 など
- 3

ジャイバーカ錠50mg,100mg

日本新薬

血液内科

【組成】 1錠中 ビルトブルチニブとして50mg,100mg 抗悪性腫瘍剤 可逆的非共有結合型BTK阻害剤
【効能・効果】 ○他のBTK阻害剤に抵抗性又は不耐容の再発又は難治性のマントル細胞リンパ腫
- 4

カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」

沢井製薬

薬剤部

【組成】 1カプセル中 カルシトリオール0.5μg 活性型ビタミンD3製剤
【効能・効果】 ○骨粗鬆症 ○下記疾患におけるビタミンD代謝異常に伴う諸症状（低カルシウム血症、しびれ、テタニー、知覚異常、筋力低下、骨痛、骨病変等）の改善
★ロカルトロールカプセル0.5は削除
- 5

パロキセチン錠5mg,20mg「明治」

Meiji Seika ファルマ

薬剤部

【組成】 1錠中 日局パロキセチン塩酸塩水和物5.69mg（パロキセチンとして5mg）,22.76mg（パロキセチンとして20mg） 選択的セロトニン再取り込み阻害剤
【効能・効果】 ○うつ病・うつ状態 ○パニック障害 ○強迫性障害 ○社会不安障害 ○外傷後ストレス障害
★パロキセチン錠5mg,20mg「SPKK」は削除
- 6

エルロチニブ錠25mg,100mg,150mg「NK」

日本化薬

薬剤部

【組成】 1錠中 エルロチニブとして25mg,100mg,150mg 抗悪性腫瘍剤 上皮増殖因子受容体（EGFR）チロシンキナーゼ阻害剤
【効能・効果】 ○切除不能な再発・進行性で、がん化学療法施行後に増悪した非小細胞肺癌 ○治癒切除不能な肺癌 など
★タルセバ錠25mg,100mg,150mgは削除

【5】 患者限定採用薬品に関するお知らせ

■ 患者限定採用薬品として以下5製剤5品目の薬剤が承認されました。

- 1

ビキセオス配合静注用

日本新薬

血液内科

【組成】 1バイアル中 ダウノルピシン塩酸塩47mg（ダウノルピシンとして44mg）、シタラビン100mg 抗悪性腫瘍剤
【効能・効果】 ○高リスク急性骨髄性白血病
- 2

ヒフデュラ配合皮下注

アルジェニクスジャパン

脳神経内科

【組成】 1バイアル中 エフガルチギモド アルファ 1008mg,ボルヒアルロニダーゼ アルファ 11200単位 抗FcRn抗体フラグメント・ヒアルロン酸分解酵素配合製剤
【効能・効果】 ○全身型重症筋無力症（ステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤が十分に奏効しない場合に限る） ○慢性炎症性脱髄性多発根神経炎
- 3

スキリーシ皮下注180mgオートドーズー

アッヴィ

消化器内科

【組成】 カートリッジ1本中 リサンキズマブ180mg ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤
【効能・効果】 ○中等症から重症の活動期クローン病の維持療法 ○中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法
- 4

サフネロー点滴静注300mg

アストラゼネカ

膠原病内科

【組成】 1バイアル（2.0mL）中 アニフロルマブ（遺伝子組換え）300mg ヒト抗I型インターフェロン受容体1モノクローナル抗体
【効能・効果】 ○既存治療で効果不十分な全身性エリテマトーデス
- 5

ルブキネスカプセル7.9mg

大塚製薬

膠原病内科

【組成】 1カプセル中 ボクロスボリン7.9mg 免疫抑制剤 カルシニューリンインヒター
【効能・効果】 ○ループス腎炎

【6】 販売元などの変更

- 1

ネスブ注射液40μgブラシリンジ

削除

後発品の適応一致にともない
- 2

ネスブ注射液60μgブラシリンジ

削除

後発品の適応一致にともない
- 3

ミグリステン錠20(院外)

削除

出荷停止
- 4

アミサリン錠250mg(院外)

削除

出荷停止
- 5

テトラビック皮下注シリンジ

削除

販売中止
- 6

エビルピシン塩酸塩注射液50mg「サワイ」

削除

販売中止
- 7

テクネDMSAキット

削除

販売中止
- 8

フランドル錠20mg(院外)

削除

販売中止
- 9

トプシムスプレー0.0143%(院外)

削除

販売中止
- 10

フルコートスプレー0.007%(院外)

削除

販売中止
- 11

オゼンビック皮下注2mg

1本/箱→2本/箱

包装規格変更
- 12

オビソート注射用0.1g

第一三共→アルフレッサ ファーマ

製造販売承認承継 2025年6月1日
- 13

ハイドレアカプセル500mg

クニジエン→チェブラファーム

製造販売承認承継 2025年7月1日

【7】 その他

1. 第416回の薬事委員会と診療会議における確認が終了しましたので、下記の通り整理検討を行います。

正式名称	薬効	結果
カソデックス錠80mg	前立腺癌治療剤	必要時採用薬品へ区分変更